

EVALUACIÓN Y MANEJO DEL PACIENTE DE TRAUMA

		PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Menciona o toma precauciones para el aislamiento de sustancias corporales		1	
EVALUACIÓN DE LA ESCENA			
Determina la seguridad de la escena		1	
Determina el mecanismo de lesión		1	
Determina el número de pacientes		1	
Solicita ayuda adicional si es necesario		1	
Considera inmovilización de columna		1	
EVALUACIÓN INICIAL			
Mención su impresión general del paciente		1	
Determina el nivel de respuesta del paciente		1	
Determina la queja principal / probables amenazas contra la vida		1	
Evaluación de vía aérea y ventilación	Evaluación	1	
	Inicia terapia de oxigenación adecuada	1	
	Asegura adecuadamente la ventilación	1	
	Manejo la lesión	1	
Evaluación de la circulación	Evaluación y de hemorragia masiva	1	
	Evalúa pulso	1	
	Evalúa piel (color, temperatura y condición)	1	
Identifica la prioridad del paciente / decide el traslado del paciente		1	
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL PACIENTE DE TRAUMA / HISTORIA RÁPIDA Y EXPLORACIÓN FÍSICA			
Selecciona la evaluación apropiada (evaluación rápida o enfocada)		1	
Obtiene o evalúa directamente los signos vitales		1	
Obtiene información mediante la nemotecnia SAMPLE		1	
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA			
Evaluación de la cabeza	Inspecciona y palpa el cráneo y las orejas	1	
	Evalúa los ojos	1	
	Evalúa cara incluyendo cavidad oral y nasal	1	
Evaluación del cuello	Inspecciona y palpa el cuello	1	
	Evalúa la existencia de distensión yugular	1	
	Evalúa la existencia de desviación traqueal	1	
Evaluación del tórax	Inspección	1	
	Palpación	1	
	Auscultación de tórax	1	
Evaluación de pelvis y abdomen	Evalúa el abdomen	1	
	Evalúa la pelvis	1	
	Verbaliza la evaluación genital / perineal si es necesaria	1	
Evaluación de extremidades	1 punto por cada extremidad Incluyendo inspección, palpación, evaluación de pulsos, actividad motora y sensorial	4	
Evaluación posterior	Evalúa tórax posterior	1	
	Evalúa región lumbar	1	
Manejo apropiado de daños o lesiones secundarias 1 punto por el manejo adecuado de cada una		1	
Menciona la reevaluación de los signos vitales		1	
TOTAL		40	

CRITERIOS ERRÓNEOS

- No menciona o no toma precauciones para el aislamiento de sustancias corporales
- No determina la seguridad de la escena
- No realiza la evaluación para la protección de la columna
- No realiza la inmovilización de columna cuando está indicada
- No administra concentraciones altas de oxígeno
- No encuentra o no maneja problemas asociados con la vía aérea, ventilación, hemorragia o choque (hipoperfusión)
- No diferencia entre la necesidad de traslado inmediato del paciente vs continuar con la evaluación del paciente en la escena
- Realiza exploración física detallada antes de evaluar la vía aérea, ventilación y circulación
- No transporta al paciente dentro de los primeros 10 minutos del tiempo límite